

اومكس كومي

الوظيفة

من المعروف ان العناصر الصغرى ضرورية لنمو النبات ولكن بسبب ظروف مثل نوعية التربة ورطوبتها ودرجة ال PH لها يحدث نقص لتلك العناصر في الانسجة النباتية مما يؤدي الي اضرار نظام التمثيل الغذائي المرتبط بالبناء الضوئي والتنفس وتخليق الاحماض الامينية ولذلك اومكس كومي يوفر مجموعة متوازنة من العناصر الصغرى والتي يسهل امتصاصها من خلال الاوراق

الوصف

هو عبارة عن مستحلب سائل قابل للذوبان في الماء يحتوي على عناصر صغرى مخلبة ومغنيسيوم وكبريت



تحليل اومكس كومي

وزن / حجم			
2.60%	Fe	(EDTA)	حديد
2.60%	Zn	(EDTA)	ذنك
1.95%	Mn	(EDTA)	منجنيز
1.00%	B		بورون
0.33%	Cu	(EDTA)	نحاس
0.03%	Mo		موليبدينوم
1.30%	MgO		ماغنسيوم
1.82%	S		كبريت
5.7-6.7			PH
1.30-1.34 @ 18°C			الكثافة

طريقة الاستخدام

يجب ملء تانك الرش بالماء الي نصف الكمية المطلوبه للرش ثم معايرة الكمية المستخدمه من اومكس دي بي ثم تضاف الي التانك مع التقليب الجيد ثم بعدها تضاف كمية المياه المتبقية الي التانك وتتم عملية الرش



التخفيف

كمية المياه الموصى بها هي
500 : 1500 لتر لكل هكتار

دائماً قم برج العبوة قبل الاستخدام

توصيات الاستخدام

الحصول	مللي/100لتر	لتر/هكتار	ملاحظات
افوكادو	100	1.0	من 2 : 3 معاملات الاولي بعد التزهير ثم تكرر بفاصل 4 اسابيع
التوت البري	100-200	1.0	ثلاث معاملات الاولي بعد 2 شهر من الزراعة وتكرر كل 30 يوم
القمح	250	1.0	من 2 : 4 معاملات الاولي في مرحلة الاشطاء (التفرع القاعدي) والثانية عند استظالة الساق والاخيرة عند تكوين السنابل
الموالح	150	1.5	ثلاث معاملات من بداية تكون البرعم وحتى خروج الورقة الثانية
البن	100	1.0	من 2 : 3 معاملات الاولي قبل شهر من التزهير والثانية عند النمو الجديد
القطن	200	1.0	من 2 : 4 معاملات الاولي عند تكون البرعم ثم تكرر كل 15 يوم والاخيرة بعد التزهير ب شهر
الحيار / الشمام	200	1.0	من 2 : 4 معاملات الاولي بعد 30:40 يوم من الانبات ثم تكرر كل 10 يوم
العنب	100-150	1.5	من 2 : 3 معاملات بعد ظهور الاوراق ب 2 اسبوع وحتى الثمار
الكوي	150	1.5	التطبيق 4 معاملات تبدأ بعد 2 اسبوع من ظهور الاوراق
الخضروات الورقية	200	1.0	من 3 : 5 معاملات الاولي بعد الزراعة ب 30 يوم وتكرر كل من 10 : 15 يوم
ثمار الكاجو	100	1.0	من 2 : 4 معاملات الاولي بعد التزهير وتكرر كل 30 يوم
الزيتون	150	1.5	ثلاث معاملات الاولي علي الاشجار الناضجة بعد العقد وتكرر كل 30 يوم
البصل	150	0.75	من 2 : 4 معاملات الاولي بعد الزراعة ب شهر وتكرر كل 10:15 يوم
فاكهة الباشن	100	1.0	من 3 : 4 معاملات الاولي قبل التزهير وتكرر كل 15 يوم
البزلاء والفاصوليا	150	0.75	من 2 : 3 معاملات الاولي عند تكون البراعم وتكرر كل 10 يوم
الاناناس	50	1.0	من 4 : 6 معاملات الاولي بعد الزراعة ب شهر وتكرر كل 30 يوم
الفواكه التفاحية	100-150	1.0	من 3 : 4 معاملات الاولي قبل التفتيح والثانية بعد التفتيح والاخيرة عند خروج المرحلة الثانية من الاوراق
البطاطس	250	1.0	من 2 : 5 معاملات بفارق 15 يوم
الفواكه ذات النواة الحجرية	66-100	1.0	معاملتين الاولي بعد التزهير والثانية بعد العقد
الشاي	100	1.0	ثلاث معاملات الأولى عند بداية هطول الأمطار ، الثانية بعد الحصاده الأولى والثالثة بعد شهر من الثانية
التبغ	100-200	0.75	من 2 : 3 معاملات الاولي بعد النقل ب 15 يوم وتكرر كل 10:15 يوم
الطماطم	100-200	1.0	من 2 : 5 معاملات تبدأ من بداية التزهير وتكرر كل 10 ايام

احتياطات الخلط

اومكس كومي ملائم للخلط مع معظم المبيدات ومنظمات النمو والعناصر المغذية الصغري ولكن ليس كلها مناسب للخلط معه , مع الاخذ في الاعتبار التفاعلات الناتجة عن الخلط والتأثير علي النبات ولذلك يجب اجراء تجرية خلط مصغرة قبل التعميم والشركة لا تتحمل اي مسؤولية عن سوء الاستخدام بما في ذلك الحرارة وحالة النبات المعامل ومرحلة النمو وكمية المياه المستخدمه

احتياطات الامان

يجب تخزين اومكس كومي بعيداً عن التجميد تتراوح درجة حرارة التخزين المناسبة بين 4°C-5 وهو ماده غير خطرة وغير قابلة للاشتعال يجب ارتداء القفازات وواقى الوجه عند التعامل مع الماده في حالة التخزين لفترة طويلة قد يحدث ترسيب خفيف للماده ولذلك يجب الرج قبل الاستخدام

OMEX
AGRIFLUIDS



العبوات

اومكس كومي يأتي في عبوات
سعة 1 لتر و 5 لتر

H.Q. المركز الرئيسي +966 13 581 5588
P.O. Box : 158 ص.ب : +966 13 581 5895
الاحساء : 31982 info@alyaseenagri.com
السعودية SAUDI ARABIA www.alyaseenagri.com