

سويتش

62.5% ديليو جي

وداعا لأعفان الثمار
فعالية مزدوجة لحماية مستمرة



المادة الفعالة :-

فلوديوكسونيل 250 جم/كجم
سايبيرودونيل 375 جم/كجم

الوصف :-

يتركب المبيد من مادتين فعاليتين كل مادة تختلف عن الأخرى في طريقة عملها مما يؤدي الي مكافحة مجموعة كبيرة من الامراض وتحسين فعالية المبيد والوقاية من حدوث المناعة . حيث يستخدم في علاج أعفان الثمار بمحاصيل الفاكهة و الخضر

صور الاصابات علي المحاصيل المختلفة



عفن البوتريتس في الطماطم



عفن البوتريتس في الفراولة



عفن البوتريتس في العنب



البوتريتس وجلوميرالا في العنب



عفن البوتريتس في الخس



عفن البوتريتس في الخيار



عفن البوتريتس في الفلفل



عفن البوتريتس في الطماطم



البوتريتس في ساق الطماطم

طريقة الاستخدام والجرعات :-

المحصول	المرض	معدل الاستخدام لتر/هكتار	ميعاد المعاملة	فترة الامان
العنب	Botrytis cinerea, Glomerella cingulata,	600-1200 جم/ هكتار	عند الإزهار / عند تفتح البراعم / عند بداية التلوين / ما قبل الحصاد	35 يوم
الفراولة	Botrytis cinerea	800-1200 جم/ هكتار	قبل التزهير / بعد التزهير / قبل الحصاد	3 يوم
الباذنجان		600-1000 جم/ هكتار		14 يوم
الطماطم		800-1000 جم/ هكتار		7 يوم
القرعيات		600-1000 جم/ هكتار	عند ظهور الاعراض الاولية للاصابة	7 يوم
الخس		600-1000 جم/ هكتار		14 يوم
البازلاء والفاصوليا	Botrytis cinerea Ascochyta pisi Sclerotinia	800-1000 جم/ هكتار		14 يوم
الكمثري	Stemphylium spp	600-800 جم/ هكتار	من بداية الازهار وحتى قبل الحصاد	14 يوم
الفواكة ذات النواة الحجرية	Monilinia spp (Flower/ Twig blight) Monilinia spp (Brown rot)	300-450 جم/ هكتار	اثناء الازهار وقبل الحصاد	14 يوم
نباتات الزينة	Botrytis cinerea	600-1000 جم/ هكتار	عند ظهور الاعراض الاولية للاصابة	-

العبوات :

سويتش متاح في عبوة سعة 250 جم